

Solutio Iodi Cum Glycerini (Płyn Lugola) (10mg + 20mg)/g, płyn, 20 g



Cena: 11,55 zł

Opis słownikowy

Postać	Płyn
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne COEL S.J. E.Z.M. Konstany
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

SOLUTIO IODI CUM GLYCERINI COEL

(Iodum + Kalii iodidum)

Płyn na skórę, (10 mg+20 mg)/g

Skład:

1 g płynu zawiera:

Substancje czynne:

- jod 10 mg,
- jodek potasu 20 mg

Substancje pomocnicze:

- gliceryna 99,5%,
- woda oczyszczona

Działanie:

Odkazanie skóry nieuszkodzonej.

Wskazania do stosowania:

Roztwór do stosowania miejscowego na skórę, do odkażania skóry nieuszkodzonej, otarć naskórka, drobnych zadrapań oraz brzegów

ran.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w postaci nie rozcieńczonej bezpośrednio na rany i oparzenia. Nie stosować przy nadwrażliwości na jod, nadczynności tarczycy, gruźlicy płuc i niewydolności nerek.

Nie stosować u noworodków i niemowląt

Interakcje:

Długotrwałe stosowanie preparatu z jodem może zaburzać badania czynnościowe tarczycy. Niedobór jodu nasila, a nadmiar jodu osłabia wrażliwość na leczenie nadczynności tarczycy tyreostatykami. Należy zatem odstawić preparat jodowy przed i w czasie leczenia nadczynności tarczycy. Bezwzględnie preparatu z jodem nie należy stosować ze związkami rtęci.

Działania niepożądane:

U osób nadwrażliwych na jod może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy nosowo – gardłowej, zapalenie skóry z pojawieniem się pęcherzyków, świądem, wrzodziejącymi nadżerkami. Czasami mogą wystąpić objawy ogólne z gorączką, wysypką, obrzmieniem węzłów chłonnych, a nawet wstrząsem groźnym dla życia.

Przewlekłe stosowanie preparatów z jodem może wywołać nadczynność tarczycy, trądzik jodowy oporny na leczenie, alergię miejscową lub uogólnioną.

Stosowanie dużych dawek jodu u chorych na wole endemiczne może prowadzić do tyreotoksykozy.

Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią:

Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. Brak danych na temat stosowania preparatu u kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Należy unikać niekontrolowanego stosowania związków jodu przez kobiety ciężarne i karmiące piersią, w tym także preparatów stosowanych miejscowo na skórę i błony śluzowe.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:

Długotrwałe stosowanie preparatu lub stosowanie na duże powierzchnie skóry może być przyczyną nadczynności tarczycy u pacjentów z utajonymi zaburzeniami czynności tarczycy (zwłaszcza u pacjentów w wieku starszym).

Sposób stosowania i droga podania:

W celu odkażenia skóry nieuszkodzonej stosować roztwór nie rozcieńczony. Zmienione chorobowo miejsce należy pędzlować lub przemyć sterylnym gazikiem nasączonym roztworem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Pozwolenie nr R/3422.