

Soyfem Forte 230,8 mg, tabletki powlekane, 30 tabl. (3 blist. po 10 tabl.)



Cena: 46,49 zł

Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	BIOFARM SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

SOYFEM FORTE, 230,8 mg, tabletki powlekane: Każda tabletkę powlekana zawiera 230,8 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z *Glycine max* L. semen (nasion soi) (100 – 400 : 1), co odpowiada 60 mg zespołu izoflawonów, w przeliczeniu na genisteinę. Rozpuszczalnik używany do ekstrakcji: etanol 60% – 70% V/V.

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki ginekologiczne, pozostałe leki

Kod ATC: G 02 C

Wskazania do stosowania: SOYFEM FORTE jest wskazany do stosowania u kobiet w okresie przekwitania w celu łagodzenia występujących objawów, takich jak: uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zakłócenia snu, uczucie napięcia nerwowego i niepokoju.

Dawkowanie i sposób podawania: 1 – 2 tabletki raz na dobę, najlepiej w trakcie posiłku. Nie należy przekraczać 2 lat stosowania produktu SOYFEM FORTE.

Dzieci i młodzież: SOYFEM FORTE nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania: SOYFEM FORTE przyjmuje się doustnie, najlepiej w trakcie posiłku, popijając tabletkę płynem. Linia podziału na tabletkę tylko ułatwia jej przełamanie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na soję, olej sojowy, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża i karmienie piersią.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Należy zachować ostrożność u kobiet z nowotworami piersi i przerostem endometrium w wywiadzie.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: Nie zaobserwowano.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację: SOYFEM FORTE jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn: SOYFEM FORTE nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w zalecanej jednostce dawkowania, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Działania niepożądane: Dotychczas nie stwierdzono.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309; Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Przedawkowanie: Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: 10519 (wydane przez Ministra Zdrowia).

OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Dostępne opakowania: 30 tabletek powlekanych.