

# Spirytus salicylowy 2%, roztwór na skórę, 100 g



Cena: 3,23 zł

## Opis słownikowy

Postać	Roztwór
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

## Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Spirytus salicylowy 2% LGO to lek w postaci płynu przeznaczony do stosowania na skórę. Substancją czynną produktu jest kwas salicylowy, który wykazuje działanie antybakteryjne i przeciwzapalne, dlatego stosuje się go jako środek dezynfekujący miejscowo do odkażania skóry w okolicach rany.

Kwas salicylowy działa również keratolitycznie, czyli złuszcza oraz delikatnie osusza skórę, dlatego stosowany jest również w leczeniu trądziku, czy łojotoku. Należy aplikować go za pomocą wacika lub tamponu.

### Wskazania

- Miejscowe odkażanie skóry w okolicach rany.
- Spirytus salicylowy stosuje się również w leczeniu trądziku i łojotoku.
- Skład

100 g leku zawiera:

- substancje czynne: kwas salicylowy 2 g,
- substancje pomocnicze: etanol 760 g 68%, woda oczyszczona 30%.

## Działanie

Lek spirytus salicylowy znany jest z działania:

- odkażający,
- bakteriobójczego,
- keratolitycznego.

## Dawkowanie

- Lek przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego na skórę.
- Przecierać skórę tamponem lub wacikiem nasączonym spirytusem 1-2 razy dziennie.

## Przeciwwskazania

- Nie należy stosować leku na otwarte rany i duże powierzchnie skóry, bo po jego wchłonięciu mogą wystąpić objawy zatrucia kwasem salicylowym.
- Nie należy stosować spirytusu salicylowego u niemowląt.

## Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. poniżej 25°C, w oryginalnym, dobrze zamkniętym opakowaniu. Chronić od światła.

## Działania niepożądane

Jak każdy lek spirytus salicylowy może powodować działania niepożądane, jednak dotychczas żadnych nie odnotowano.

## Interakcje

Brak danych wskazujących na interakcje spirytusu salicylowego z innymi lekami.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek zawiera kwas salicylowy o stężeniu 2%, który działa drażniąco na skórę i może powodować miejscowe zapalenie kontaktowe u osób uczulonych na salicylany oraz powodować podrażnienie i wysuszenie skóry w przypadku częstego stosowania.
- Należy unikać kontaktu spirytusu salicylowego z błonami śluzowymi.
- W przypadku stosowania spirytusu salicylowego 2% u dzieci należy zachować ostrożność.
- Lek nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania.
- Chronić oczy.
- Środek łatwopalny.

## Podmiot odpowiedzialny

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o. o.  
11-001 Dywity  
ul. Spółdzielcza 25A