

## Strepsils Intensive, tabletki do ssania, 36 tabl.

Cena: 40,63 zł



### Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	RECKITT B.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

### Opis produktu

**Tabletki do ssania Strepsils Intensive** to lek stosowany w bólu gardła o działaniu przeciwzapalnym oraz przeciwbólowym. Strepsils Intensive zawiera flurbiprofen z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i już od drugiej minuty po zastosowaniu powleka oraz łagodzi dolegliwości związane z infekcją gardła. Działanie leku utrzymuje się do 4 godzin i jest on przeznaczony do doraźnego leczenia dla dzieci w wieku powyżej 12 lat oraz dorosłych.

#### Skład:

Substancją czynną leku jest flurbiprofen.

1 tabletki do ssania zawiera 8,75 mg flurbiprofenu.

Substancje pomocnicze: makrogol 300, potasu wodorotlenek, aromat cytrynowy, lewomentol, syrop glukozowy, syrop sacharozowy, miód.

#### Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie, tabletki należy ssać powoli, zmieniając ich położenie w jamie ustnej, aby zapobiec miejscowemu podrażnieniu. Strepsils Intensive jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia, więc bez konsultacji nie stosować dłużej niż 3 dni.

Zalecane dawkowanie Strepsils Intensive to 1 tabletki do ssania co 3 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobową to 5 tabletek do ssania.

#### Działanie:

Strepsils Intensive działa silnie przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Tabletki do ssania zawierają flurbiprofen, należący do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), a działanie terapeutyczne rozpoczyna się już od drugiej minuty i utrzymuje się do 4 godzin od zastosowania. Strepsils Intensive powleka oraz łagodzi.

#### Wskazania:

Wskazaniem do zastosowania tabletek do ssania Strepsils Intensive jest krótkotrwałe leczenie objawów bólu gardła u osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

#### Przeciwwskazania:

Nie stosować Strepsils Intensive u osób z nadwrażliwością na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek składnik tego leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest: występowanie kiedykolwiek objawów alergii na kwas acetylosalicylowy, inne NLPZ; istniejąca lub przebyta chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, ciężkie zapalenie jelita grubego; krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; ciężka niewydolność wątroby, nerek, serca.

#### Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Bardzo często** występujące działania niepożądane (u 1 lub więcej na 10 osób): zaburzenia smaku

**Często** występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): zawroty głowy, ból głowy, parestezja, podrażnienie gardła, biegunka, owrzodzenie jamy ustnej, nudności, ból jamy ustnej, parestezje w jamie ustnej, ból gardła, ból brzucha, kserostomia.

**Niezbyt często** występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): bezsenność, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli, duszność, świszczący oddech, pęcherze w jamie ustnej, niedoczulica gardła, wzdęcie, zaparcie, niestrawność, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, bolesność języka, wymioty, wysypka, świąd.

**Rzadko** występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): zaburzenia krwi, nadwrażliwość, szok anafilaktyczny, niewydolność serca, obrzęk, niewydolność nerek, niewydolność wątroby.

**Bardzo rzadko** występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): trombocytopenia, neuropenia, agranulocytoza, anemia aplastyczna, anemia hemolityczna, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka.

**Częstość nieznaną:** nadciśnienie, krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie przewodu pokarmowego, perforacja przewodu pokarmowego, rumień wielopostaciowy, gorączka, zapalenie wątroby, bezsenność.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:

- choruje lub chorował na astmę lub alergię,
- przyjmuje jakiegokolwiek inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub kwas acetylosalicylowy,
- jest w podeszłym wieku - prawdopodobnie może być bardziej podatny na działania niepożądane,
- cierpi na toczeń rumieniowaty układowy i mieszaną chorobę tkanki łącznej,
- przechodzi zapalenie migdałków lub może mieć zakażenie bakteryjne gardła,
- cierpi na: chorobę serca, nerek, wątroby, przewodu pokarmowego, niewydolność serca, podwyższone ciśnienie krwi, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, zwiększony poziom cholesterolu we krwi, długotrwałe bóle głowy, jest po udarze mózgu,
- pali tytoń,
- jest w I lub II trymestrze ciąży.

Leki takie jak flurbiprofen mogą nieznacznie zwiększać ryzyko ataku serca (zawał mięśnia sercowego) lub udaru.

Lek Strepsils Intensive zawiera sacharozę. W przypadku nietolerancji na niektóre cukry, należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku.

Alkohol może zwiększać ryzyko reakcji niepożądanych, szczególnie krwawień w obrębie przewodu pokarmowego.

#### Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.  
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

#### Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

#### Strepsils Intensive może wchodzić w interakcje z:

- lekami przeciw nadciśnieniu tętniczemu lub niewydolności serca,
- lekami moczopędnymi (w tym leki moczopędne oszczędzające potas),

- lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi,
- lekami przeciwplatekowymi i selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwyty serotoniny (SSRI)
- lekami przeciw dnie moczanowej,
- innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub steroidami,
- glikozydami nasercowymi,
- cyklosporyną,
- fenytoiną,
- metotreksatem,
- antybiotykami chinolonowymi,
- takrolimusem,
- zydowudyną,
- litem.

#### **Ciąża i karmienie piersią**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

#### Ciąża:

Nie należy przyjmować leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży. W pierwszych sześciu miesiącach ciąży przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

#### Karmienie piersią:

Kobiety karmiące piersią przed zastosowaniem leku powinny skonsultować się z lekarzem.

#### **Wpływ na płodność:**

Strepsils Intensive należy do grupy leków – niesteroidowe leki przeciwzapalne, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. W przypadku trudności w zajściu w ciążę, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem flurbiprofenu.

#### **Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:**

Nie stosować Strepsils Intensive u dzieci w wieku poniżej 12 lat.