

# Sutricon UV Protect - Silikonowy Żel do pielęgnacji blizn, 15 ml



Cena: 35,88 zł

## Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	VERCO
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Kosmetyk

## Opis produktu

### Sutricon UV Protect silikonowy żel na blizny z filtrem przeciwsłonecznym SPF 35, 15 ml

Produkt kosmetyczny

#### Wskazania

Sutricon UV Protect żel zalecany jest do pielęgnacji blizn:

- W miejscach narażonych na ekspozycję słoneczną
- O długości 10 cm
- Po liftingu twarzy oraz szyi
- Po korekcie powiek
- Po zabiegach chirurgicznych w okolicach ust (np. lip lift)

#### Działanie

Sutricon UV Protect SPF 35 silikonowy żel do pielęgnacji blizn wzbogacony o filtr przeciwsłoneczny. Przeznaczony jest do stosowania na blizny znajdujące się w narażonych na ekspozycję słoneczną partiach ciała (twarz, szyja, ręce). Regularne stosowanie żelu silikonowego poprawia wygląd blizn, zmniejsza ją i rozjaśnia. Żel szybko wysycha, tworząc na powierzchni skóry elastyczną, niewidoczną powłokę utrzymującą odpowiedni stopień nawilżenia skóry i chroniącą bliznę przed czynnikami

zewnątrznymi.

Sutricon UV Protect posiada wielokierunkowy mechanizm działania: silikon chroni skórę przed nadmierną utratą wody oraz filtr przeciwsłoneczny SPF 35 chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Ekspertki zalecają stosowanie minimum SPF 30 mając na względzie, że między wartością ochrony wyrażoną SPF, a ilością blokowanego (pochłanianego lub odbijanego) promieniowania UVB nie ma zależności liniowej. Preparat o współczynniku SPF 30 chroni przed promieniowaniem UVB w 96,7% a SPF 50 – 98,3%<sup>1</sup>.

### Zalety produktu

- Zmniejsza widoczność blizny i wyrównuje jej koloryt
- Niewodnista żelowa konsystencja,
- Bez efektu świecącego filmu, matowe wykończenie (non-oily)
- Może być łączony z innymi metodami terapeutycznymi np. masażem,
- Może być używany pod makijaż,
- Może być stosowany u dzieci powyżej 1. roku życia.

### Składniki

Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer, C12-15 Alkyl Benzoate, Octocrylene, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Ethylhexyl Salicylate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Glyceryl Behenate

### Sposób użycia i zawartość opakowania

Po całkowitym zagojeniu rany (kiedy zejda wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można rozpocząć stosowanie żelu Sutricon. Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieś niewielką ilość preparatu i masuj ją kolistymi ruchami przez około 2-3 min. Rozcieraj bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców. Zaleca się stosowanie żelu minimum dwa razy dziennie. Długość stosowania jest indywidualna i zależy od wielu czynników, m.in. wieku blizny, uwarunkowań genetycznych oraz od jej rodzaju:

- minimum 3 miesiącach w przypadku świeżych blizn
- w przypadku starszych blizn (nawet 9letnich) na efekty należy poczekać dłużej, nawet do miesięcy

Opakowanie: żel z filtrem przeciwsłonecznym o pojemności 15 ml