

SVR Sensifine Ar Creme SPF50+, krem, 40 ml

Cena: 74,72 zł



Opis słownikowy

Postać	Krem
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SVR
Rejestracja	Kosmetyk

Opis produktu

Czy po ekspozycji na słońcu na twojej twarzy pojawiają się zaczerwienienia i uwidaczniają naczynka krwionośne? Sensifine AR SPF50+ łączy w sobie bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną z działaniem kojącym skórę naczyńową. Działa przeciwzapalnie. Redukuje zaczerwienienia i chroni twoją skórę, gdy zbyt mocno ją eksponujesz na słońcu.

Produkt hipoalergiczny. Skuteczność udowodniona pod kontrolą dermatologiczną.

SKUTECZNOŚĆ UDOWODNIONA NA SKÓRZE WRAŻLIWEJ I ZE SKŁONNOŚCIĄ DO TRĄDZIKU RÓŻOWATEGO:

- 96% badanych potwierdziło natychmiastowe ukojenie skóry¹
- 74% badanych potwierdziło zmniejszenie zaczerwienienia¹
- 71% badanych potwierdziło, że ich cera stała się bardziej ujednoliconą²

¹samoocena, 23 ochotników, aplikacja dwa razy dziennie przez 21 dni, % zadowolenia

²Samoocena, 21 ochotników, aplikacja dwa razy dziennie przez 28 dni, % zadowolenia

SKUTECZNOŚĆ UDOWODNIONA PO ZABIEGACH PILINGUJĄCYCH

- 86% potwierdziło, że produkt trwale ukoił skórę³
- ³Samoocena po zabiegu pilingu, 22 ochotników, aplikacja dwa razy dziennie przez 14 dni, % zadowolenia

Jak działa?

Trądzik różowaty ma związek z zaburzeniami naczynioruchowymi, a dokładniej ze wzmożoną reaktywnością naczyń krwionośnych skóry twarzy. Przyczyną występowania mogą być uwarunkowania genetyczne oraz czynniki środowiskowe jak np. częsta zmiana temperatury (mróz, upał) czy promieniowanie UV.

-UVB oddziałuje na zewnętrzne warstwy skóry powodując zaczerwienienia, rumień.⁴

-UVA penetruje głębsze warstwy skóry uszkadzając jej strukturę. Przyczynia się do ścieczenia skóry, która staje się bezbronna na zewnętrzne czynniki drażniące.

-Dodatkowo promienie podczerwone powodują odczucie intensywnego ciepła co prowadzi do zaostrzenia trądziku różowatego.⁵

W przypadku posiadania skóry z tendencją do trądziku różowatego bardzo istotne jest unikanie bezpośredniej ekspozycji na słońce aby zminimalizować objawy zaostrzeń.

Kluczowe jest codzienne stosowanie produktów przeciwsłonecznych o szerokim spektrum ochrony. Skóra z tendencją do trądziku różowatego wymaga specjalistycznych receptur o maksymalnej tolerancji.

⁴J.Talvas, G.Martinroche, K.Lanchais, S.Rougé, N.Goncalves-Mendes and M.-P.Vasson (2017). La vitamine D induit ex vivo une production dose-dépendante de cathélicidine par les cellules mononucléées du sang périphérique. Nutrition clinique et métabolisme, volume 31, 250-251.

⁵ 22 July 2020. En quoi les rayons infrarouges sont-ils bons pour la peau ? L'infrarouge. <https://www.abisco.be/fr/blog/...>

DERMATOLOGICZNE SKŁADNIKI AKTYWNE W WYSOKICH STĘŻENIACH

Endothelyol®: redukuje zaczerwienienia, poprawia mikrocyrkulację, zmniejsza skłonność do pojawiania się nowych naczynek krwionośnych

Ekstrakt z lukrecji: koi i działa przeciwzapalnie

Filtry UVA + UVB + IR + światło widzialne: fotostabilne filtry o szerokim spektrum działania.

Produkt testowany pod kontrolą dermatologiczną na skórze ze skłonnością do trądziku różowatego. Hipoalergiczny

Produkt przyjazny dla środowiska!

50% plastiku, z którego wykonana jest tubka pochodzi z recyklingu. Opakowanie w 100% zdatne do ponownego przetworzenia

INGREDIENTS: AQUA/WATER/EAU, DIISOPROPYL ADIPATE, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, DICAPRYLYL ETHER, ETHYLHEXYL TRIAZONE, SILICA, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, CETEARYL ALCOHOL, C12-15 ALKYL BENZOATE, DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE, CETEARETH-20, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, GLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL, ACRYLATES/C12-22 ALKYL METHACRYLATE COPOLYMER, 1,2-HEXANEDIOL, NIACINAMIDE, POLYESTER-7, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE, NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE, CAPRYLYL GLYCOL, ARGININE, XANTHAN GUM, COCO-GLUCOSIDE, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL, DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE, POLYSORBATE 60, SORBITAN ISOSTEARATE, LECITHIN, ROSMARINYL GLUCOSIDE, CAFFEYL GLUCOSIDE, GALLYL GLUCOSIDE, LEPIDIUM SATIVUM SPROUT EXTRACT

Aplikować obficie i równomiernie przed ekspozycją na słońce, pokrywając całą odsłoniętą skórę. Zmniejszenie zastosowanej ilości znacznie obniża poziom ochrony. Środek ochrony przeciwsłonecznej nigdy nie zapewnia całkowitej ochrony. Często powtarzać aplikację, aby zachować ochronę, zwłaszcza po poceniu się, pływaniu lub osuszeniu ręcznikiem. Unikaj ekspozycji na słońce w godzinach od 12:00 do 16:00 gdy promienie słońca są najsilniejsze lub upewnij się, że nosisz odzież ochronną. Poparzenie słoneczne jest niebezpieczne, szczególnie dla dzieci. Używaj środków ochrony przeciwsłonecznej, które są odpowiednie dla Twojego typu skóry. Stosowanie tego produktu nie powinno zachęcać do dłuższego przebywania w słońcu. Przedłużone narażenie na działanie słońca może być niebezpieczne. Nie wystawiaj dzieci ani niemowląt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Jak stosować?

Może być stosowany samodzielnie lub na codzienny krem nawilżający .

Należy równomiernie rozprowadzić odpowiednią ilość preparatu tak aby dokładnie pokryć ekspozowaną na słońce powierzchnię skóry twarz, szyję, dekolt. Zbyt oszczędne aplikowanie zmniejsza skuteczność zabezpieczenia. Aplikację powtarzać tak często jak to konieczne aby utrzymać ciągłość ochrony przeciwsłonecznej zwłaszcza przy podwyższonej potliwości ciała, po kąpielii lub po wytarciu skóry ręcznikiem