

# Syrop Prawoślazowy, 125 g



Cena: 4,10 zł

## Opis słownikowy

Postać	Syrop
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

## Opis produktu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

### Syrop Prawoślazowy

(Sirupus Althaeae)

125 g

#### Skład:

100 g produktu zawiera:

macerat z 5 g korzenia prawoślazu 35,9 g

sacharoza 64,0 g

kwas benzoesowy 0,1g

**Działanie:** Syrop prawoślazowy osłania błony śluzowe jamy ustnej i gardła chroniąc je przed podrażnieniem.

**Wskazania do stosowania:** Suchy kaszel, podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

**Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość (uczulenie) na składniki produktu. Uczulenie na kwas benzoesowy.

**Środki ostrożności związane ze stosowaniem:** Lek zawiera sacharozę. 5 ml syropu zawiera 4,2 g sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu) mniej niż 100 mg na dawkę.

Nie należy stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

Jeżeli wystąpi duszność, gorączka i ropna wydzielina należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

**Interakcje:** Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

**Ciąża i karmienie piersią:** Ze względu na brak danych, przed zastosowaniem syropu należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Brak danych.

**Sposób stosowania i droga podania:**

Lek należy stosować doustnie. Zazwyczaj stosowana dawka to:

Dzieci od 3 do 6 roku życia: 2,5 ml - 5 ml 3 razy dziennie

Dzieci od 6 do 12 roku życia: 5 ml - 10 ml 3-4 razy dziennie

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 10 ml – 15 ml 3-4 razy dziennie.

Maksymalna dawka dobową do 5 razy dziennie.

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 1 tydzień należy skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane: Nieznane.

**Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Termin ważności:

**Podmiot odpowiedzialny**

Afłofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Te. (42) 22-53-100

**Wytwórca**

Afłofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Krzywa 2

95-030 Rzgów

Pozwolenie nr: 12180