

Syrop tymiankowy złożony 15 g/100g, 125 g

Cena: 6,23 zł



Opis słownikowy

Postać	Syrop
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY

ZASTOSOWANIE

Syrop tymiankowy złożony wskazany jest do stosowania w kaszlu towarzyszącym nieżytom górnych dróg oddechowych jako środek wykrztuśny

WSKAZANIA

W kaszlu towarzyszącym nieżytom górnych dróg oddechowych jako środek wykrztuśny.

DZIAŁANIE

W kaszlu towarzyszącym nieżytom górnych dróg oddechowych jako środek wykrztuśny.

SKŁAD

100 g syropu zawiera substancje czynne: 15 g Thymi extractum fluidum (1:3) ekstrahent – mieszanina o składzie: amonowy wodorotlenek (96 g/l), glicerol (860 g/l), etanol (736 g/l), woda; 0,01 g Thymolum.

Substancje pomocnicze: wodorotlenek amonowy (96,0 g/l), etanol (760 g/l), syrop prosty. (Zawartość etanolu – nie więcej niż 4,8% (m/m)).

SPOSÓB UŻYCIA

Podanie doustne.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie 10 ml (łyżka stołowa). Dzieci w 6 – 12 roku życia: 3 razy dziennie 5 ml (łyżeczka od herbaty).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Syrop tymiankowy złożony:

W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana należy skonsultować się z lekarzem.

PRZECIWWSKAZANIA

w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu wymienionych w punkcie 6;

jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na rośliny z rodziny wargowatych Labiatae/Lamiaceae;

u dzieci do 6 roku życia; u osób z chorobą alkoholową.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Syrop tymiankowy złożony zawiera sacharozę, należy stosować ostrożnie u osób chorych na cukrzycę. W przypadku wcześniejszego stwierdzenia nietolerancji niektórych cukrów, przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli objawy nasiliły się, nie ustąpią po kilku dniach albo towarzyszyć im będzie duszność, gorączka lub ropna wydzielina, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Produkt zawiera nie więcej niż 4,8% (m/m) etanolu. Jednorazowa dawka leku (10 ml) zawiera ok. 0,36 g etanolu, co jest równoważne 9 ml piwa i 3,75 ml wina. Nie stosować u osób z chorobą alkoholową. Należy uwzględnić zawartość etanolu u dzieci oraz u pacjentów z chorobami wątroby i padaczką.

INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI

Nie odnotowano interakcji.

OSTRZEŻENIA

Syrop tymiankowy złożony zawiera sacharozę, należy stosować ostrożnie u osób chorych na cukrzycę. W przypadku wcześniejszego stwierdzenia nietolerancji niektórych cukrów, przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli objawy nasiliły się, nie ustąpią po kilku dniach albo towarzyszyć im będzie duszność, gorączka lub ropna wydzielina, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Produkt zawiera nie więcej niż 4,8% (m/m) etanolu. Jednorazowa dawka leku (10 ml) zawiera ok. 0,36 g etanolu, co jest równoważne 9 ml piwa i 3,75 ml wina. Nie stosować u osób z chorobą alkoholową. Należy uwzględnić zawartość etanolu u dzieci oraz u pacjentów z chorobami wątroby i padaczką.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków

ZAWARTOŚĆ NETTO

125 g., 1250 g

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

REJESTRACJA

Produkt leczniczy

SUBSTANCJA CZYNNNA

Thymi extractum fluidum (1:3) ekstrahent – mieszanina o składzie: amonowy wodorotlenek (96 g/l), glicerol (860 g/l), etanol (736 g/l), woda. Thymolum.

NUMER POZWOLENIA

IL-4528/LN

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze poniżej 25 o C.

Chronić od światła.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.