

# Taninal 500 mg, tabletki, 20 tabl.

Cena: 12,29 zł



## Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

## Opis produktu

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Taninal® to produkt leczniczy stosowany tradycyjnie, którego skuteczność opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu. Taninal zawiera połączenie garbników – kwasu taninowego (taniny) z białkiem – albuminą. Dzięki takiemu połączeniu, lek nie wywiera silnego działania drażniącego na błonę śluzową żołądka. Preparat uwalnia garbniki w jelicie cienkim pod wpływem działania enzymu trawiennego – pankreatyny. Uwolniona tanina wykazuje działanie ściągające i bakteriostatyczne, działa także przeciwbiegunkowo, tworząc trudnorozpuszczalne kompleksy z toksynami bakteryjnymi. Ponadto hamuje drobne krwawienia przy uszkodzeniach naczyń włosowatych śluzówki jelit.

Taninal stosuje się tradycyjnie w biegunkach oraz w przypadku zatruc pokarmowych.

### Jak stosować Taninal

Lek stosować doustnie, tabletkę po zażyciu popić wodą.

Dorośli – 3 razy na dobę 1 do 2 tabletek.

Dzieci powyżej 4 lat i młodzież – 2 do 3 razy na dobę ½ do 1 tabletki.

Preparat należy przyjmować między posiłkami do ustąpienia objawów.

### W przypadku zażycia większej dawki Taninalu niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki Taninalu i pogorszenia samopoczucia (nudności, wymioty), należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### W przypadku pominięcia dawki Taninalu:

Kontynuować leczenie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

### Zanim zastosuje się Taninal

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Nie należy stosować leku Taninal równocześnie z innymi lekami. Pomiedzy przyjęciem Taninalu i innych leków powinny upłynąć co najmniej 2 godziny, ponieważ Taninal może hamować wchłanianie innych leków.

#### **Stosowanie leku Taninal u dzieci:**

Nie stosować u dzieci poniżej 4 roku życia.

#### **Ciąża lub karmienie piersią:**

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Przed użyciem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

#### **Inne leki**

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

#### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:**

Lek ten nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Jeżeli mimo zastosowanego leczenia biegunka nasila się lub nie ustępuje przez okres dłuższy niż 2-3 dni u dorosłych i młodzieży lub ponad 1 dzień u dzieci, należy zgłosić się do lekarza.

#### **Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Taninal mogą wystąpić:

Zaburzenia żołądka i jelit (nudności, wymioty) – rzadko (1-10 na 10 000 pacjentów stosujących lek).

#### **Przechowywanie leku Taninal**

Lek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

#### **Skład**

Skład w przeliczeniu na 1 tabletkę:

Substancja czynna: białczan taniny (Tanninum albuminatum) – 500 mg

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sól sodowa karboksymetyloskrobi, powidon, talk.

**Opakowanie:** 20 tabletek.