

Trilac Lady gyno, globulki dopochwowe, 10 glob.



Cena: 31,84 zł

Opis słownikowy

Postać	Globulki dopochwowe
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	LABORATOIRE LID
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdy ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

trilac® lady gyno

ZASTOSOWANIE

trilac® lady gyno to globulki dopochwowe, których składniki tworzą nawilżającą powłokę ochronną na błonach śluzowych, co chroni nabłonek pochwy przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz wpływa na zmniejszenie dyskomfortu związanego z uczuciem suchości, napięcia, świądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy. Stosowanie wyrobu medycznego poprawia elastyczność pochwy, utrzymuje i przywraca jej fizjologiczne pH, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej oraz redukuje nieprzyjemny zapach. Wyrób medyczny trilac® lady gyno jest przeznaczony szczególnie dla kobiet w wieku rozrodczym oraz w okresie menopauzy.

WSKAZANIA

Wyrób medyczny trilac® lady gyno jest przeznaczony dla kobiet w wieku rozrodczym oraz w okresie menopauzy, w celu łagodzenia dyskomfortu i uczucia suchości, napięcia, świądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy związanych z:

- atrofią błon śluzowych pochwy;
- niedoborem estrogenów;
- dyspareunią (bolesnością stosunków);
- długotrwałym stresem.

W celu wspomaganie nawilżenia nabłonka pochwy:

- po zabiegach chirurgicznych i ginekologicznych;
- po obtarciach i innych niewielkich urazach mechanicznych błon śluzowych pochwy;
- po porodzie;
- po chemioterapii, radioterapii, krioterapii;
- po zabiegach laserowych;

- przy zmianach wywołanych stosowaniem leków hormonalnych;
- w okresie okołomenopauzalnym.

Wyrób zaleca się również w celu zapobiegania niekorzystnym zmianom we florze i pH pochwy (podróże, basen, sauna, fitness, antybiotykoterapia) poprzez nawilżenie i utrzymanie naturalnego pH pochwy. Stosowanie wyrobu redukuje nieprzyjemny zapach z pochwy.

Produkt niehormonalny.

Nie zawiera PEG, parabenów, detergentów w tym: SLS, SLES.

DZIAŁANIE

Po aplikacji wyrobu trilac® lady gyno dopochwowo następuje wytworzenie nawilżającej powłoki ochronnej na błonach śluzowych, co chroni nabłonek pochwy przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz wpływa na zmniejszenie dyskomfortu związanego z uczuciem suchości, napięcia, swiądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy. Zawartość w wyrobie soli sodowej kwasu hialuronowego oraz octanu witaminy E zabezpiecza i nawilża śluzówkę. Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta dotyczące zastosowania wyrobu. Instrukcję używania należy zachować, aby w razie konieczności móc ponownie ją przeczytać. Kwas mlekowy sprzyja utrzymaniu właściwego pH pochwy na poziomie $\leq 4,5$ (odczyn kwaśny).

SKŁAD

1 globulka zawiera: sól sodową kwasu hialuronowego, glikogen, kwas mlekowy, octan tokoferylu, mleczan sodu, glicerydy półsyntetyczne.

SPOSÓB UŻYCIA

Uwaga:

1. Przed aplikacją wyrobu dokładnie umyć ręce.
2. Z blistra wyjąć 1 globulkę poprzez oderwanie folii wzdłuż perforacji i rozchylenie listków folii.
3. Globulkę umieścić głęboko w pochwie.

Uwaga: W przypadku gdy konsystencja globulki jest zbyt miękka, przed wyjęciem z folii należy umieścić ją na kilka minut w lodówce do momentu stwardnienia globulki.

DAWKOWANIE

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 1 globulkę na noc przez 7 kolejnych dni. Następnie w celu utrzymania działania przyjmować 1 globulkę co 2-3 dni, aż do ustąpienia objawów. Nie stosować wyrobu dłużej niż przez 30 dni.

W przypadku pominięcia zastosowania globulki, nie stosować dawki podwójnej.

Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego!

OSTRZEŻENIA I PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.

Nie stosować ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż preparat może osłabiać lub opóźniać ich działanie.

Nie stosować wraz z lateksowymi prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi, ponieważ wyrób poprzez zawartość tłuszczów może ograniczać ich skuteczność.

Nie odbywać stosunków płciowych bezpośrednio po aplikacji globulki.

W ciąży i w trakcie karmienia stosować po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku ostrej infekcji pochwy stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

Nie stosować w czasie menstruacji.

Unikać przypadkowego kontaktu wyrobu ze śluzówką oka, nosa lub ust.

Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego.

Nie stosować w przypadku upływu terminu ważności.

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia blistra.

Nie stosować ponownie raz zaaplikowanej globulki.

Ze względu na zawartość kwasu mlekowego mogą wystąpić nieznaczne reakcje skórne (łagodnie pieczenie lub swędzenie) zwłaszcza przy dużej suchości pochwy. Objawy te mają charakter przejściowy i zwykle ustępują samoistnie.

DYSTRYBUTOR

Zakład Farmaceutyczny AMARA sp. z o.o.
ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków

WYTWÓRCA

LABORATOIRE L'IDEAL Parisien Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 8, 32-064 Niegoszowice

ZAWARTOŚĆ NETTO

2 Blistry po 5 globulek (10 globulek).
Masa jednej globulki ok. 1,6 g

POSTAĆ

Globulki dopochwowe

REJESTRACJA

Wyrób medyczny