

Vagical 1,5 g, globulki dopochwowe, 10 szt.



Cena: 18,35 zł

Opis słownikowy

Postać	Globulki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	FARMINA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Vagical
Produkt leczniczy OTC

Dzięki korzystnemu składowi opartemu o naturalne, doskonale przebadane substancje czynne, Vagical świetnie sprawdza się przy podrażnieniach, otarciach, dyskomforcie czy początkach infekcji w okolicy kobiecych narządów rodnych. Zawarty w globulkach Vagical wyciąg z nagietka lekarskiego działa przyczynowo - przeciwgrzybicznie i przeciwbakteryjnie oraz objawowo – przeciwzapalnie, wspomagając gojenie i proces regeneracji. Vagical działa ściśle w miejscu podania co sprawia, że nie wywołuje interakcji z innymi lekami oraz antykoncepcją doustną. Po uprzednim zwilżeniu dobrze rozpuszcza się w wydzielinie błony śluzowej i uwalnia substancje czynną już po paru minutach, łagodząc objawy i zmniejszając świąd. Vagical osłania zmienione błony śluzowe, chroniąc przed utratą wilgoci i wnikaniem drobnoustrojów.

Vagical
Calendula officinalis TM – 150 mg
globulki
10 sztuk

Wskazania: stany zapalne dróg rodnych objawiające się upławami, świądem, pieczeniem, zaczerwienieniem okolicy warg sromowych.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku:

W nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Nie stosować u dziewczynek poniżej 12 roku życia. Stosowanie u osób w wieku 12-18 lat po konsultacji z lekarzem.

Interakcje z innymi lekami:

Brak.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą wystąpić objawy nadwrażliwości przejawiające się podrażnieniem błony śluzowej pochwy i sromu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku i zgłosić te działania niepożądane

lekarzowi, farmaceucie lub podmiotowi odpowiedzialnemu.

Skład: nalewka macierzysta z nagietka lekarskiego (Calendula Officinalis TM), glikol polioksyetylenowy.

Sposób użycia: lek przeznaczony jest do podawania dopochwowego. Dorosłe kobiety: 1 globulka 2-3 razy dziennie. Przed zastosowaniem globulkę należy zwilżyć przegotowaną, ostudzoną wodą.

Pozwolenie nr: IL-5949/LN-H

Interakcje z innymi lekami: nie stwierdzono

Podmiot odpowiedzialny: Farmina sp. z o.o. ul. Lipska 44, 30-721 Kraków

Przechowywanie

Produkt przechowywać w temperaturze do 25 stopni Celsjusza, w oryginalnym opakowaniu.

Chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.