

## Verdin Max, kapsułki, 15 kaps.

Cena: 20,71 zł



### Opis słownikowy

Postać	Kapsułki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	USP ZDROWIE SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Suplementy diety

### Opis produktu

**Valerin max** to produkt leczniczy o właściwościach uspokajających.

#### Skład

Substancją czynną jest wyciąg wodno-alkoholowy z korzenia kozłka (*Valerianae radice extractum hydroalcoholicum siccum*), 8-11:1).

1 tabletkę zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka (*Valerianae radice extractum hydroalcoholicum siccum*), 8-11:1) w połączeniu z nośnikami (30%). Nośnikami są maltodekstryna (29%) i krzemionka koloidalna bezwodna (1%). Ekstrahent: etanol 60% (V/V).

Substancje pomocnicze: mannitol, skrobia kukurydziana wapnia wodorofosforan bezwodny, sodu laurylosiarczan, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, brąz HT(E155), Capol 1295 (wosk biały pszczeli i wosk karnauba).

1 tabletkę zawiera 179,43 mg laktozy jednowodnej.

#### Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

**Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:** 1 tabletkę 3 razy na dobę.

- Maksymalnie 4 razy dziennie po 1 tabletkę.
- Dla uzyskania najlepszego efektu terapeutycznego zaleca się leczenie przez 2-4 tygodnie.
- Jeżeli objawy się nasiliły lub nie ustąpią po 2 tygodniach, należy skonsultować się z lekarzem.

## Działanie

**Valerin max** jest lekiem roślinnym o działaniu uspokajającym.

## Wskazania

**Valerin max** jest przeznaczony do stosowania w łagodnych stanach napięcia nerwowego i uczucia niepokoju.

## Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku **Valerin max**

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
- u dzieci poniżej 12 lat.

## Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

### Częstość nieznana:

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, skurcze brzucha)

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

## Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

## Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

## Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

## **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

W czasie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

## **Podmiot odpowiedzialny**

USP Zdrowie Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa