

# Xenna balance, proszek, 20 sasz.

Cena: 54,39 zł



## Opis słownikowy

Postać	Saszetki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	USP ZDROWIE SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis

#### **Wskazania:**

leczenie przewlekłych zaparć

*Wiek:* od 12 roku życia

*Postać:* proszek do sporządzania roztworu doustnego

#### **Substancje czynne:**

1 saszетка zawiera: makrogol (PEG) 3350 13,125 g, chlorek sodu 0,3507 g, sodu wodorowęglan 0,1785 g, chlorek potasu 0,0466 g

#### **Pozostałe składniki:**

aromat pomarańczowy (zawiera substancje aromatyzujące, maltodekstrynę, gumę akacjową i alfa-tokoferol), aromat cytrynowo-limonkowy (zawiera substancje aromatyzujące i ekstrakty zapachowe, maltodekstrynę, mannitol, glukonolakton, sorbitol, gumę akacjową i krzemionkę koloidalną bezwodną), sacharynian sodu, krzemionka koloidalna bezwodna.

Produkt zawiera substancje słodzącą sacharynian sodu.

Opakowanie: 6 lub 20 saszetek po 13,81 g

Substancją aktywną preparatu Xenna Balance jest makrogol 3350 (13,1 g/saszetkę), który zmiękcza masy kałowe, pobudza naturalne ruchy jelit i w rezultacie ułatwia wypróżnienie. W większości przypadków prawidłowa perystaltyka jelit i częstotliwość wypróżnień powracają w ciągu 24-48 godzin. Preparat działa miejscowo w obrębie jelita i nie jest wchłaniany do organizmu.

Elektrolity zawarte w preparacie pomagają utrzymać prawidłowy poziom sodu, potasu i wody w organizmie podczas leczenia zaparcia. Zapobiega to utracie elektrolitów i wody przez organizm.

**Dawkowanie i sposób stosowania:**

Dorośli, osoby w podeszłym wieku, dzieci (w wieku co najmniej 12 lat): zazwyczaj stosowana dawka to jedna saszetka przyjmowana od jednego do trzech razy dziennie. Po otwarciu zawartość saszetki wsypać do szklanki. Wlać około 125 ml wody (pół szklanki). Dobrze wymieszać, aby proszek całkowicie się rozpuścił, a następnie wypić. Zazwyczaj leczenie zaparcia nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie.

**Możliwe działania niepożądane:**

Objawy uczulenia, takie jak wysypka, świąd, duszność lub problemy z oddychaniem. Objawy wskazujące na zmianę poziomu płynów lub elektrolitów (soli) w organizmie, takie jak obrzęki (głównie w obrębie kostek), uczucie osłabienia, narastające zmęczenie lub pragnienie z towarzyszącym bólem głowy. Bóle brzucha; łagodna biegunka (w przypadku osób rozpoczynających stosowanie Xenny Balance biegunka ustępuje zwykle po zmniejszeniu liczby przyjmowanych saszetek); nudności (mdłości); wymioty; obrzęk jamy brzusznej (uczucie wzdęcia); wzdęcia (wiatry); ból w okolicy odbytu; burczenie w brzuchu.

**Podmiot odpowiedzialny**

USP Zdrowie Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa