

# Xylorin, Natural spray do nosa, 20ml

Cena: 22,66 zł



## Opis słownikowy

Postać	Spray
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	LABORAT MENAR
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

XYLORIN Natural spray d/nosa 20ml

Wyrób medyczny w postaci aerozolu, przeznaczony do udrażniania zatkanego nosa. Skład preparatu oparty został na naturalnych składnikach, zaś sama formuła nie wysusza śluzówki.

### Skład

97% woda morska, sorbitol, myristamidopropyl PG-dimonium chloride phosphate & aqua, aromat (olejki eteryczne z mięty i eukaliptusa gałkowego), polyepsilon-lysine & aqua, alkohol, olejek eteryczny z Niaouli. E.O.B.B.D. 100% naturalne.

### Przeznaczenie produktu

Do łagodzenia objawów ze strony nosa: kataru, kichania i zatkania.

### Wskazania

Preparat wskazany jest do stosowania podczas przeziębienia i zapalenia nosogardzieli.

### Charakterystyka produktu

Wyrób medyczny Xylorin Natural łączy w sobie właściwości hipertonicznej wody morskiej z olejkiem eterycznym Niaouli i aromatami mięty oraz eukaliptusa gałkowego. Zastosowanie preparatu pozwala udrożnić nos, oczyścić go i zmniejszyć takie objawy jak katar, kichanie czy zatkany nos.

### Sposób użycia:

- Wydmuchać nos.
- Głowę trzymać w pozycji pionowej.
- Rozpylić preparat do każdego otworu nosowego, wykonując lekki wdech przez nos.

- Przed wydmuchaniem nosa należy odczekać kilka minut, aby roztwór zaczął działać.

#### Stosowanie produktu

Dzieci w przedziale wieku 6-15 lat: rozpylić 1 raz do każdego otworu nosowego, do 4 razy dziennie.

Dzieci powyżej 15 lat i osoby dorosłe: rozpylić 1 raz do każdego otworu nosowego, do 6 razy dziennie.

Maksymalny czas stosowania wyrobu wynosi 10 dni. W przypadku utrzymywania się objawów ze strony nosa, należy skonsultować z lekarzem.

#### **Przeciwwskazania i środki ostrożności**

Nie stosować preparatu w przypadku astmy.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.

Zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia opakowania.

#### **Możliwe działania niepożądane:**

- Rzadko: przemijająca reakcja ze strony nosa.
- Wyjątkowo rzadko: krwotok z nosa, nudności, bóle głowy.
- Ciąża i karmienie piersią
- Nie stosować preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.
- Stosowanie u dzieci i młodzieży
- Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia.